

## INSTRUCTIVO PARA RECOLECCIÓN DE COPROCULTIVO

- La materia fecal debe obtenerse en el período agudo de enfermedad. **Antes** del tratamiento antibiótico o por lo menos 72hs. Después de suspendido el mismo.
- **Retirar del laboratorio:** un sobre que contiene un hisopo estéril y un tubo con medio de transporte (stuart).
- La deposición se efectuará en un recipiente limpio (tipo palangana ó similar) y **No en el inodoro.**
- Cualquier deposición del día es válida.
- La muestra debe obtenerse de una sola deposición y **se recolectará una pequeña cantidad**, tocando con la punta del hisopo en las zonas que presenten aspecto sanguinolento, mucoso o consistencia diarreica.

### Conservación y Traslado:

- Introducir el hisopo en el tubo con el medio de transporte y remitirlo al laboratorio de inmediato.
- Si esto no fuera posible, mantenerlo no más de 12 horas a temperatura ambiente.

### El material será rechazado:

- Si está demasiado lleno.
- Si no está bien tapado.
- Si el medio de cultivo no cubre la materia fecal (en la punta del hisopo).

***IMPORTANTE: La veracidad del resultado depende del correcto seguimiento de éste instructivo.***

**Extracciones:** Lunes a Viernes de 6:30 a 10:00 hs. / **Retiro de Resultados:** Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hs. ó a través de nuestro **Portal de Salud:** [www.obsba.org.ar/portal-de-salud](http://www.obsba.org.ar/portal-de-salud) / **Atención al Afiliado:** 0800.348.1014 - Opción 2

